

Suporte Básico de Vida Adulto

MANTER SBV

Mantenha as manobras de reanimação
(30 compressões alternando com 2 insuflações) até:

- Chegar ajuda diferenciada;
- Ficar exausto;
- A vítima retomar sinais de vida

Avaliar as Condições de Segurança:

Reanimador,
Vítima
e Terceiros



Avaliar o Estado de Consciência



Ligar 112



Realizar Compressões Torácicas: 30 compressões

(100 a 120
por minuto)



Permeabilizar a Via Aérea



Avaliar a Respiração: Ver, Ouvir e Sentir



Realizar 2 insuflações, após as 30 compressões



NOVO CORONAVÍRUS COVID-19

ALTERAÇÕES NA ABRIGAGEM A VÍTIMA EM
PARAGEM CARDIORRESPIRATORIA

NÃO EXECUTAR O VER, OUVIR E SENTIR

VERIFICAR SINAIS DE VIDA POR MOVIMENTOS VOLUNTÁRIOS OU TORÁXICOS

COBRIR BOCA E NARIZ DA VÍTIMA

COM FASCINHA CIRÚRGICA OU PAPEL

NÃO FAZER VENTILAÇÕES

MANTER COMPRESSÕES ININTERRUPTAS

TELA DE PROTEÇÃO E/OU IMBUIÇÃO DE ANÁLISE, CHEQUE DE CALIBRE

PROTEJA-SE