

Avaliar as Condições de Segurança:

Reanimador, Vítima e Terceiros



1

Avaliar o Estado de Consciência



2

Permeabilizar a Via Aérea



3

Avaliar a Respiração:

Ver
Ouvir e
Sentir



4

Ligar 112



5


Realizar Compressões Torácicas:

30 compressões (100 a 120 por minuto)



6

Realizar 2 insuflações, após as 30 compressões



7

MANTER SBV

Mantenha as manobras de reanimação (30 compressões alternando com 2 insuflações) até:

- Chegar ajuda diferenciada;
- Ficar exausto;
- A vítima retomar sinais de vida



NOVO CORONAVÍRUS COVID-19

ALTERAÇÕES NA ABORDAGEM À VÍTIMA EM PARAGEM CARDIORRESPIRATÓRIA

NÃO EXECUTAR O VER, OUVIR E SENTIR

VERIFICAR SINAIS DE VIDA POR MOVIMENTOS VOLUNTÁRIOS OU TORÁCICOS.

COBRIR BOCA E NARIZ DA VÍTIMA

COM MÁSCARA CIRÚRGICA OU PANO.

NÃO FAZER VENTILAÇÕES

MANTER COMPRESSÕES ININTERRUPTAS

100 A 120/MIN EXCETO EM MOMENTO DE ANÁLISE/CHOQUE DO DAE.

PROTEJA-SE.